

informativostelecinco.com

Inicio Lo último Nacional Economía Tecnología **Sociedad** Deportes + secciones En la tele

ES NOTICIA > Venus Plaza Tahrir Wii U Roland Garros Eurocopa Trailers Lo + visto Blogs

🔴 LA RED CON PRECIADO: Conmoción en Twitter por la muerte de Manolo Preciado

EL TRATAMIENTO ANTI-TNF EN PACIENTES CON EII

Dentro de la edición de la SED 2012 se celebró una mesa enmarcada en el Curso SEPD/AGA (American Gastroenterological Association) sobre 'Nuevas técnicas de imagen en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal' con la participación de expertos internacionales y nacionales y en la que se puso de manifiesto, entre otras técnicas, el papel de primera línea que está desempeñando la resonancia magnética (RM) para un mejor seguimiento de los pacientes con Enfermedad de Crohn.

Según el doctor Manuel Barreiro de Acosta de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Servicio de Aparato Digestivo de Santiago y uno de los expertos de la SEPD "al tratarse de una técnica que no emplea radiaciones ionizantes, parece idónea para este tipo de pacientes, crónicos y que debutan jóvenes en la enfermedad. Además, la entero-RM es una exploración bien tolerada, rápida y de fácil interpretación, que permite identificar igualmente cada uno de los patrones clínicos de esta enfermedad, lo que repercute en un mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes".

Por ello, la resonancia magnética permite "controlar mejor la actividad de la enfermedad", ya que con esta técnica se puede medir tanto el grosor de la pared intestinal como el grado de vascularización o las diferentes capas del intestino, indicadores que sirven para conocer en qué medida está activa la enfermedad.


Otra de las mesas destacadas sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal ha sido la referente a 'Controversias en Enfermedad Inflamatoria Intestinal', en la que, entre otros temas, se abordó la importancia de valorar el riesgo-beneficio de utilizar tratamientos anti-TNF en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y neoplasia previa, así como de la necesidad de evaluar cada caso de forma individualizada para no excluir a todos los pacientes en dicha situación a priori. Este es

uno de los escenarios más

complicados que suelen plantearse a los profesionales que tratan pacientes con esta patología.

A la hora de valorar cuáles son los pacientes más adecuados a recibir un anti-TNF para tratar su EII, apunta que se podría plantear este tratamiento en aquellos que lleven más de 10 años libres de neoplasia y que no cuenten con otra alternativa terapéutica. Lo recomendable es realizar un seguimiento médico del paciente, tener bien en cuenta su historial y así, poder valorar de forma individualizada, según las propias características del paciente, los beneficios y los riesgos que conllevarían el uso de un anti-TNF.

Publicidad

| | |
|---|---|
|  <p>Plan España PLAN ofrece distintas formas de contribuir a mejorar las condiciones.</p> |  <p>Medicos sin fronteras ¿Qué consigues con tu ayuda? Sólo 10 € al mes: Vacunamos a 400 niños.</p> |
|---|---|

DÉJANOS TU OPINIÓN

▾ Usuario registrado

Usuario: Contraseña:

[¿Has olvidado o perdido tu contraseña?](#)

Entrar

> Usuario anónimo

Imágenes del Día



« « 1 2 » »

PUBLICIDAD