

## La SEPD: prevención y cribados para reducir el cáncer de colon

MADRID  
EUROPA PRESS

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) ha advertido de que en el año 2013 habrá 32.197 casos nuevos de cáncer colorrectal en España, una cifra que se traduciría en unas 16.000 muertes. Este tipo de tumor es el tercero más común en hombres, con una tasa de incidencia de 39,7 casos y una mortalidad de 18 casos por cada 100.000 habitantes. En mujeres, en cambio, ocupa la segunda posición, con una incidencia

de 23 casos y una mortalidad de 9,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Las proyecciones de este estudio, realizado por la SEPD en Aragón, se basan en datos de 1998 a 2007 y revelan que, en hombres, la prevalencia pasaría de una tasa de 237 a 273 casos por 100.000 habitantes al año (cálculos derivados de comparar datos y pronósticos entre 2007 y 2022). Además, la tasa de incidencia aumentaría de 48,2 a 55,2 casos, y la mortalidad de 22,7 a 26.

No obstante, en mujeres se espera una reducción de la prevalencia de 181 a 168 casos por 100.000 habitantes al año, y de la tasa de incidencia, que disminuiría de 25 a 22; también de la mortalidad que, igualmente, descendería de 11 a 10 casos por 100.000 habitantes al año.

El estudio ha señalado que existen tres causas que pueden relacionarse con el descenso de las tasas de mortalidad por cáncer colorrectal: los cambios en los factores de riesgo (obesi-

dad, actividad física reducida y consumo de tabaco y alcohol), los programas de cribado y las mejoras en los tratamientos: "La mayor esperanza para revertir esta situación es prevención y cribado".

Los datos epidemiológicos apoyan la necesidad de extender los programas de cribado a todo el territorio español, "tanto para evitar el sufrimiento de las personas como porque son coste-efectivos", ha concretado el presidente de SEPD, Miguel Muñoz Navas.