



Portada impresa

Hemeroteca

Secciones

Ediciones

Multimedia

Suplementos

Servicios

LA RAZÓN.es



OPINIÓN
Alfonso Ussía

Elige tu localidad



OPINIÓN ESPAÑA INTERNACIONAL ECONOMÍA SOCIEDAD SALUD RELIGIÓN DEPORTES MOTOR CULTURA TOROS VIAJES LIFESTYLE

SALUD

Uno de cada tres pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal deja de responder al tratamiento antes de un año



Hace 23 minutos

Ep. Madrid.

La enfermedad inflamatoria intestinal engloba entre otras la colitisucerosa y la enfermedad de Crohn e implica medicación de por vida para mantener su remisión, pero actualmente un 10 por ciento de los pacientes no responden al tratamiento y hasta un 30 por ciento pierden la respuesta entre los 6 meses y el año de utilizarlo. "Nos obliga a intensificar el tratamiento o cambiar de agente biológico", según ha reconocido el especialista de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) Joaquín Hinojosa, que ha participado en el XXI Curso de Postgrado SEPD-AGA de Avances en Gastroenterología y Hepatología impartido en el LXXIII Congreso Anual de esta sociedad científica celebrado en Valencia.

Para dar respuesta a estos problemas y evitar que los pacientes deban someterse a una cirugía, que tampoco es garantía de remisión (ya que en la enfermedad de Crohn suele reaparecer en casi el 90 por ciento de los casos) los expertos e investigadores trabajan en la búsqueda de nuevos fármacos que actúen por vías diferentes al TNF-alfa. En estos pacientes hay otros factores que mantienen la inflamación, por lo que "se buscan y estudian nuevas moléculas que actúen sobre vías muy concretas, que serán muy selectivos y sin efectos