

23 de abril 2018

Editado por
europa press

infosalus.com




□ SALUD FARMACIA ACTUALIDAD MUJER NUTRICIÓN ESTÉTICA ASISTENCIA MAYORES

ENFERMEDADES □

— PARA ELIMINAR LA INFECCIÓN EN ESPAÑA —

Sociedades científicas crean un consenso para diagnosticar la hepatitis C en un "único paso"



EUROPA PRESS - Archivo

Publicado 03/04/2018 13:59:41 CET

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC-GEHEP) han elaborado, junto a la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en

Lo más leído en...

- 1 El cerebro es capaz de reprogramarse para combatir la demencia
- 2 El peligro de las cabinas de bronceado y de los rayos UVA
- 3 Asertividad: Aprende a quererte con estas estrategias
- 4 Cómo aliviar el estreñimiento en los más pequeños
- 5 Mitos y realidades sobre las vacunas

Hoy Una semana Un mes

Últimas noticias de salud

12:40

Asistencia

Crean un tratamiento que disminuye el rechazo a los implantes

España (AEHVE), han creado un documento de consenso para el diagnóstico de la hepatitis C en un "único paso", con el fin de avanzar en la eliminación de la infección en España.

El diagnóstico en un único paso consiste en la investigación de la infección activa (anticuerpos y viremia) en una misma muestra. Un diagnóstico unificado que, a juicio de los expertos, disminuiría el tiempo de acceso al tratamiento y evitaría pérdidas de seguimiento que pueden alcanzar hasta el 40 por ciento de los pacientes diagnosticados.

De hecho, aunque el 81 por ciento de los hospitales españoles dispone de medios para realizar el diagnóstico de la infección por VHC en un solo paso, únicamente lo hace el 31 por ciento, lo que, además de pérdidas de seguimiento, resulta "ineficiente" porque "sobrecarga" las consultas de los especialistas con hasta un tercio de pacientes que han resuelto la infección de forma espontánea o tras un tratamiento antiviral previo.

En la infección por el VHC se pueden detectar anticuerpos frente al VHC (anti-VHC), que sólo indican exposición o contacto previo con el virus, y marcadores virológicos, que indican replicación del virus y actividad de la infección.

El tratamiento antiviral persigue eliminar la replicación del VHC, considerándose que la infección por VHC se ha curado cuando transcurridas 12 semanas después de finalizar el tratamiento antiviral no se detecta ARN del VHC en el plasma del paciente.

En este sentido, tal y como han informado las organizaciones científicas, para poder definir correctamente qué pacientes deben acceder a las consultas hospitalarias como candidatos al tratamiento es "imprescindible" identificar a los pacientes que son virémicos, entre el 0,3 y 0,5 por ciento de la población general. Asimismo, el diagnóstico de infección activa por VHC está indicado también en pacientes con infección resuelta que mantienen comportamientos de riesgo para la reinfección.

En concreto, el diagnóstico en un solo paso consiste en la investigación de viremia en todos los pacientes de nuevo diagnóstico serológico. Por ello, el consenso establece que "tras la solicitud de una determinación de un test de anticuerpos frente al VHC y una vez comprobado que se trata de la primera vez que se solicita y/o que no se ha efectuado un diagnóstico virológico previo, se debe proceder a la determinación de la viremia (sin mediar nueva petición clínica) en las mismas condiciones de seguridad que se efectúa hasta este momento, es decir, asegurando la ausencia de contaminación y degradación de la muestra biológica, asegurando la estabilidad de la muestra y garantizando el resultado final".

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA HEPATITIS C

Del mismo modo, según establece el documento de consenso, para conseguir implementar el diagnóstico en un solo paso, se necesitan cumplir las siguientes etapas: cribado mediante detección de anticuerpos: serología VHC; determinación de los anticuerpos frente al VHC solo si debe efectuarse en una ocasión si el resultado es positivo; y caracterización de paciente nuevo o el que nunca ha recibido tratamiento antiviral, determinación de viremia.

12:39

Asistencia

Las piedras en el riñón se pueden prevenir

11:18

Asistencia

El Hospital de Guadalajara desarrollará un proyecto piloto sobre la seguridad quirúrgica de los pacientes

11:16

Asistencia

Desarrollan un modelo 3D que facilita el estudio de microambiente tumoral para evaluar su influencia en cáncer de pulmón

11:08

Asistencia

'Vamos al dentista con Drakulín', un libro para que los más pequeños no tengan miedo a ir al dentista

10:43

Asistencia

Un programa de teleasistencia facilita a través del televisor la atención a mayores que sufren insuficiencia cardíaca

También se requiere un informe interpretado al médico peticionario indicando si se trata de infección activa; incluir una alerta de derivación al hospital para valoración de tratamiento en los pacientes con infección activa como comentario adicional al informe; y, adicionalmente, en los casos en los que no se haya solicitado en origen o no se disponga de ello en la historia del paciente, se aconseja completar el diagnóstico con serología de VHB y VIH.